

## RINGKASAN

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dan anak di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Di Kota Surabaya pada 2 tahun terakhir semakin menurun tahun 2016 AKI sebesar 37,00/100.000 sedangkan pada tahun 2017 AKI sebesar 34,00/100.000 kelahiran hidup kelahiran hidup. sedangkan untuk AKB di kota Surabaya menunjukkan penurunan 2 tahun terakhir, pada tahun 2016 AKB di kota Surabaya sebesar 276/1000 kelahiran hidup, pada tahun 2017 AKB di kota Surabaya mengalami penurunan sebesar 219/1000 kelahiran hidup. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Timur tingginya angka kematian ibu di Indonesia penyebab langsungnya adalah perdarahan (24,72%) dan Pre Eklamsia (30,90%), infeksi (4,87%), jantung (10,86%) dan komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, nifas (28,65%). Dari proporsi tahun 2016, faktor Pre Eklamsia/Eklamsia masih menjadi faktor dominan (30,90%) penyebab kematian ibu di Jawa Timur. (Dinkes Prov Jatim, 2016). Sedangkan menurut (Kemenkes RI, 2013). Penyebab AKB pada bayi dengan berat badan lahir rendah (25-30%), asfiksia (50-60%), infeksi (25-30%), trauma persalinan (5-10%).

Laporan tugas akhir ini dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara komprehensif (*continuity of care*) pada ibu hamil sampai dengan akhir masa nifas, serta bayi baru lahir dan KB. Asuhan yang dilakukan di BPM Mei Kurniawati Surabaya dimulai dari tanggal 03 Maret 2018 sampai 20 Mei 2018. Kunjungan hamil dilakukan sebanyak 3 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, neonatus 4 kali, dan keluarga berencana 2 kali.

Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukkan pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kesenjangan, ketika persalinan tidak dilakukan IMD, pada masa nifas hasil pemeriksaan dalam batas normal tetapi terdapat kesenjangan karena pasien pulang 6 jam post partum, pada asuhan bayi baru lahir hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak terdapat kesenjangan, dan konseling KB ibu memutuskan menggunakan KB sutik 3 bulan.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *continuity of care* yang telah dilakukan pada Ny. Y saat hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana didapatkan hasil dalam batas normal sehingga diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi sehat serta mencegah terjadinya komplikasi